



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ОДЕСТОН

Торговое название препарата: Одестон

Действующее вещество (МНН): гимекромон

Лекарственная форма: таблетки

Состав:

Одна таблетка содержит:

действующее вещество: гимекромон – 200 мг;

вспомогательные вещества: картофельный крахмал, желатин, натрия лаурилсульфат, магния стеарат.

Описание: круглые таблетки, белые или белые с желтоватым оттенком, бипланарные, с гравировкой «Ch» с одной стороны.

Фармакотерапевтическая группа: прочие препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей.

Код АТХ: A05AX02

Фармакологическое действие

Фармакодинамика

Желчегонный препарат. Увеличивает образование и выделение желчи. Оказывает селективное спазмолитическое действие в отношении желчных протоков и сфинктера Одди (не снижает перистальтику желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и артериальное давление (АД)). Уменьшает застой желчи, предупреждает кристаллизацию холестерина и тем самым развитие холелитиаза.

Фармакокинетика

При приеме внутрь легко всасывается из пищеварительного тракта, слабо связывается с белками плазмы. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается через 2-3 часа. Период полувыведения составляет около 1 часа. Гимекромон выводится почками (около 93% в виде глюкуроната, 1,4% - сульфоната, 0,3% - в неизмененном виде).

Показания к применению

Дискинезия желчевыводящих путей и сфинктера Одди по гиперкинетическому типу, некалькулезный хронический холецистит, холангит, холелитиаз; состояние после оперативных вмешательств на желчном пузыре и желчных путях. Снижение аппетита, тошнота, запоры, рвота (на фоне гипосекреции желчи).

Способ применения и дозы

Внутрь, за 30 минут до еды; взрослым – по 200-400 мг 3 раза в сутки.

Суточная доза 1200 мг.

Детям с 7 лет по 200 мг (1 таблетка) 1-3 раза в сутки. Суточная доза 600 мг.

Курс лечения 2-3 недели.

В случае пропуска приема дозы следует принять препарат как можно быстрее или, если приближается время следующего приема, пропущенную дозу не принимать. Не следует принимать двойную дозу сразу.

Побочное действие

Аллергические реакции; диарея, метеоризм, абдоминальная боль, изъязвление слизистой оболочки ЖКТ, головная боль.

Противопоказания

Гиперчувствительность. Непроходимость желчевыводящих путей, почечная/печеночная недостаточность, язвенный колит, болезнь Крона, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, гемофилия. Детский возраст до 7 лет.

Лекарственные взаимодействия

Морфин ослабляет действие гимекромона.

При совместном приеме с метоклопрамидом происходит ослабление действия обоих препаратов.

Усиливает эффекты непрямых антикоагулянтов.

Особые указания***Применение при беременности и лактации***

Нет данных о безопасности применения гимекромона в период беременности и лактации. Назначение Одестона беременным и в период лактации допустимо только в тех случаях, когда потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Меры предосторожности при применении

Смотри пункты: «Противопоказания» и «Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами».

Специальные меры предосторожности при уничтожении неиспользованного лекарственного препарата

Лекарственные препараты нельзя выбрасывать в канализацию или в домашние контейнеры для отходов. О том, как утилизировать неиспользованный препарат, узнайте у фармацевта. Эти мероприятия помогут защитить окружающую среду.

Передозировка

Нет данных, касающихся случаев передозировки лекарственного средства у людей.

Форма выпуска

Таблетки, 200 мг. По 10 таблеток в блистере ПВХ/алюминий.

По 2, 5 или 10 блистеров помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по медицинскому применению.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Отпускается без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель
Adamed Pharma S.A.

Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, Польша / Polsha

Адрес производственной площадки

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice, Польша / Polsha

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:

Представительство АО «Adamed Pharma» в Республике Узбекистан

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. 2-проезд Шахрисабз, 6

тел.: +99855 520-36-76

e-mail: info.uz@adamed.com